

Karin Menzler-Henze, Friedrich-Böhlen-Straße 14, 34414 Warburg

Aira praecox □ Frühe Haferschmiele

37/201; 4820/31; 3500812/5666299; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Edertal; nördlich Gellershausen, kleiner Silikatmagerrasen in Randlage eines Extensivgrünlandes; 342 m ü. NN; circa 1.500 Exemplare; 7. Juni 2024.

Die Art wächst dort zusammen mit *Jasione montana*, *Vulpia bromoides*, *Scleranthus polycarpus*, *Racomitrium canescens* u. a.

Ein weiterer Bestand mit circa 100 Exemplaren findet sich benachbart an einer Böschung in Waldrandlage bei 3500795/5666334.

Carex pendula □ Hänge-Segge

37/202; 4820/41; 3506624/5665880; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Bad Wildungen; mehrfach im Bachauenwald der Wilde westlich des Bilsteins; 300 m ü. NN; 5 Horste; 17. Oktober 2024; Foto.

37/203; 4920/21; 3506662/5662382; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Bad Wildungen; 373 m ü. NN; circa 5 Exemplare zwischen Sonderbach und Weg; 25. Dezember 2024.

Die Art wird bei Becker & al. (1996, Natursch. Waldeck-Frankenberg 5) nicht genannt.

Ceratocarpus claviculata □ Rankender Lerchensporn

37/204; 4819/21; 3495711/5671583; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Vöhl; südlich Asel, am Rande einer verbrachenden Lichtung im Übergang zum Besenginster-Gebüsch; 308 m ü. NN; circa 20 Individuen; 2. Juni 2023; Foto.

37/205; 4819/21; 3495841/5671934; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Vöhl; südlich Asel, am Rande einer jungen, lückigen Douglasien-Pflanzung an der Berlachseite; 335 m ü. NN; circa 20 Individuen; 6. Juni 2023; Foto.

37/206; 4819/21; 3496101/5672468; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Vöhl; südlich Asel, am Rande eines Eichen-Hainbuchen-Bestandes im Übergang zu einem lückigen Laub-Nadel-Mischwald; 328 m ü. NN; circa 200 Individuen; 29. Juni 2023; Foto.

Eleocharis uniglumis □ Einspelzige Sumpfbirse

37/207; 4820/32; 3504577/5667110; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Edertal; in quelliger Feuchtwiese nahe der Mineralquelle „Am Dorfbrunnen“ bei Kleinern; 242 m ü. NN; circa 50 Exemplare; 13. Mai 2024; Foto.

37/208; 4820/32; 3504994/5667404; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Edertal; südlich Kleinern, Feuchtwiese mit artesischem Quellbereich, unweit der Bathildisquelle; 236 m ü. NN; 400 Pflanzen; 13. Mai 2024; Foto.

37/209; 4820/41; 3506984/5667921; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Frankenberg; Edertal; südwestlich Giffitz, in quelliger Feuchtwiese nahe Mineralquelle; 218 m ü. NN; 200 Pflanzen; 30. April 2024.

Polygala amarella □ Sumpf-Kreuzblümchen

37/210; 4520/41; 3506094/5701174; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Frankenberg; Volkmarsen; östlich Hörle, Naturschutzgebiet „Iberg bei Hörle“, auf felsigem Abschnitt eines Kalk-Halbtrockenrasens; 270 m ü. NN; 5 Pflanzen; 18. Juni 2024; Foto.

Die Art wird bereits bei Becker & al. (1997, Natursch. Waldeck-Frankenberg **5**, 378) für den Raum Hörle angeführt.

*Potentilla heptaphylla* □ Rötliches Fingerkraut

37/211; 4520/41; 3506210/5701060; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Frankenberg; Volkmarsen; östlich Hörle, Naturschutzgebiet „Iberg bei Hörle“, in felsig-flachgründigem Bereich eines Kalk-Halbtrockenrasens; 289 m ü. NN; 5 Pflanzen; 27. Mai 2024; Foto.

Bei Gregor & Lehmann (2004, Bot. Naturschutz Hessen **17**, 63–76) nicht genanntes Vorkommen.

Potentilla cinerea subsp. *incana* □ Sand-Fingerkraut

37/212; 4820/41, 3507888/5665968; NO. Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Frankenberg; Bad Wildungen; auf dem Sauköppel bei Bad Wildungen; 302 m ü. NN; 10 Individuen. 22. April 2022 & 23. Mai 2024; Foto.

Potentilla cinerea subsp. *incana* kommt zudem auf dem Kleinen Mehlberg vor, dies ist der zweite Wuchsort im Landkreis.

Potentilla incana × *verna* □ Hybride aus Sand-Fingerkraut und Frühlings-Fingerkraut
37/213; 4820/41; 3507882/5665976; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Franken-
 berg; Bad Wildungen; auf dem Sauköppel bei Bad Wildungen; 303 m ü. NN; 20 Indivi-
 duen (verteilt auf zwei Wuchsstellen), zusammen mit *Potentilla cinerea* subsp. *incana*;
 22. April 2022, 23. Mai 2024.

Rhinanthus serotinus □ Großer Klappertopf
37/214; 4520/41; 3506013/5701310; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Franken-
 berg; Volkmarsen; östlich Hörle, Naturschutzgebiet „Iberg bei Hörle“, in artenreichem
 Kalk-Halbtrockenrasen; 238 m ü. NN; 3 Exemplare, zusammen mit *Polygala amarella*;
 27. Mai 2024.

Es handelt sich um die Bestätigung eines in Becker & al. (1997, Natursch. Wal-
 deck-Frankenberg 5) genannten Vorkommens.


Senecio inaequidens □ Schmalblättriges Greiskraut
37/215; 4520/11; 3502603/5705214; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Franken-
 berg; Diemelstadt; nordöstlich Rhoden, an der Kreisstraße 1 zwischen Rhoden und
 Wethen, in einem verbrachenden Kalk-Halbtrockenrasen, nahe der Autobahn 44; 283 m
 ü. NN; 2 Pflanzen; 3. Juni 2024.

Silene armeria □ Echtes Nelkenleimkraut
37/216; 4820/41; 3506778/5665821; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Bad Wil-
 dungen; Naturschutzgebiet „Bilstein bei Bad Wildungen“, am westlichen Fuß der Diabas-
 klippe im Wald-Fels-Übergang; 308 m ü. NN; 50 Pflanzen, einen blütenreichen Saum bil-
 dend, im Wald begleitet von *Tanacetum corymbosum*; 26. Juni 2024; Foto.

Es handelt sich um die Bestätigung des seit langem bekannten und in Becker & al.
 (1997, Natursch. Waldeck-Frankenberg 5) aufgeführten Vorkommens.

Thymus praecox □ Frühblühender Thymian
37/217; 4520/41; 3506199/5701052; NO; Ostwaldecker Randsenken; Waldeck-Franken-
 berg; Volkmarsen; östlich Hörle, Naturschutzgebiet „Iberg bei Hörle“, in einem beweideten
 Kalkhalbtrockenrasen; 287 m ü. NN; 1 Fleck mit circa 20 Individuen; 18. Juni 2024;
 Foto.

Triglochin palustris □ Sumpf-Dreizack
37/218; 4820/32; 3504079/5665624; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Bad Wil-
 dungen; Kesselbachtal nördlich Albertshausen, am Rand des hier grabenartig ausgebildeten
 Kesselbaches, in einer mit Rindern beweideten Feuchtwiese; 301 m ü. NN; 1 fruchten-
 des Exemplar; 20. September 2024; Foto.



Vicia pisiformis □ Erbsen-Wicke

37/219; 4819/21; 3495210/5672466; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Vöhl; südwestlich Asel, am westlichen Homberg, in Eichen-Trockenwald; 269 m ü. NN; circa 40 Individuen; 2. Juni 2023.

Eventuell handelt es sich um den bei Becker & al. (1997, Natursch. Waldeck-Frankenberg 5) angeführten Fund von Werner Eger aus dem Jahr 1982 am Hochstein bei Vöhl. Der Hochstein liegt nördlich angrenzend an den Homberg.

37/220; 4819/22; 3499942/5672726; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Bad Wildungen; Nationalpark Kellerwald-Edersee, in einem südwestexponierten, wärmeliebenden Eichen-Hainbuchen-Wald; 357 m ü. NN; 3 Pflanzen; 15. August 2022.

Bestätigung des bei Becker & al. (1997, Natursch. Waldeck-Frankenberg 5) genannten Vorkommens.

37/221; 4820/41; 3506814/5666038; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Bad Wildungen; Naturschutzgebiet „Bilstein bei Bad Wildungen“, in einem südwestexponierten, mit Kiefern durchsetzten Eichen-Wald, im Übergang zum Eichen-Hainbuchen-Wald; 394 m ü. NN; 60 Pflanzen; 17. September 2024.

Weitere Nachweise im Naturschutzgebiet gelangen bei 3506757/5665990 (2 Exemplare) und 3506681/5666362 (3 Exemplare) in Kiefern- bzw. Eichen-Hainbuchen-Wald. Die Art wird bereits bei Becker & al. (1997, Natursch. Waldeck-Frankenberg 5) für den Bilstein angeführt.

Vulpia bromoides □ Trespen-Federschwingel

37/222; 4820/31; 3500785/5666344; NW; Kellerwald; Waldeck-Frankenberg; Edertal; nördlich Gellershausen, am Übergang vom Wald zum Acker in Waldrandlage; 351 m ü. NN; circa 5000 Exemplare; 7. Juni 2024.

In der näheren Umgebung existieren weitere Vorkommen bei 3500785/5666334 (> 10 000 Exemplare), 3500574/5666163 (circa 1000 Exemplare), 3500988/5666374 (circa 100 Exemplare), 3500882/5666277 (circa 2500 Exemplare) und 3500680/5666079 (circa 200 Exemplare).

Johannes Merz, Leipziger Straße 6, 35039 Marburg

Asplenium septentrionale □ Nordischer Streifenfarn

37/223; 5117/44; 3476478/5629761; NW; Gladenbacher Bergland; Marburg-Biedenkopf; Marburg; südwestlich Elnhausen, Schieferaufschluss am Nordrand des Ohe-Tales südöstlich Weisbergskopf; 247 m ü. NN; 2 Pflanzen; 17. Februar 2024.